

Un nouveau *Besuchtetostes* R. Paulian (Col. Ceratocanthidae) de Malaisie

par

Renaud PAULIAN

Décrit en 1972 pour quatre espèces de *Ceratocanthidae* de Ceylan, le genre *Besuchetostes* est retrouvé, en 1975, en quatre autres espèces dans l'Inde du Sud.

Remarquable par la structure des pattes antérieures et des palpes labiaux et par la sculpture de la tête, du pronotum et des élytres, les espèces décrites ont un corps court et ramassé et les élytres repliés sous l'abdomen en arrière.

Une espèce du Musée de Genève, récoltée par M. T. Jaccoud en Malaisie, bien qu'à sculpture du dessus différente, partage avec ces espèces un caractère important qui justifie son rattachement au même genre. L'œil est caché d'en dessus par la carène bordant la tête et il est bien visible de profil où l'on remarque la bordure qui le limite en courbe vers l'arrière.

La disposition de l'œil et le développement éventuel du canthus oculaire étant très importants chez les *Ceratocanthidae*, il me paraît convenable de placer cette espèce dans le genre *Besuchetostes*.

Besuchetostes jaccoudi n. sp.

Type: Malaisie, Pahang, Cameron Highland, Tanah Rata, 4300', 7.VIII.1972 (T. Jaccoud), Musée de Genève.


Long. (déroulé) 5 mm. — Corps convexe, noir à fond des points chagriné mat.

Tête à angle antérieur vif, côtés arqués et crénelés, angle externe des joues largement arrondi; dessus bombé, uniformément à forte ponctuation grande, régulière et très serrée, l'espace entre les points relevé en lamelles ou en granules saillants et lisses.

Pronotum à angles antérieurs tronqués et échancrés, en forte courbe concave sur les côtés; devant un peu déprimé en travers; base saillante au milieu en courbe plate, nettement échancrée en son milieu; une trace d'impression longitudinale médiane postérieure; ponctuation forte, profonde, uniforme, très serrée, l'espace entre les points relevé en carènes ou en granules; bord externe largement crénelé.

Ecusson à pointe et, étroitement, les côtés lisses; le reste de la surface à grands points ocellés, superficiels, serrés.

Elytres à interstrie sutural relevé, ainsi que, plus faiblement, un interstrie médian et l'interstrie huméral; calus huméral court mais en lame bien détachée; ponctuation à



gros points ocellés, serrés, profonds, peu distincts, l'espace entre les points marqué par des granules luisants, plus ou moins alignés en lignes longitudinales; les granules devenant de gros tubercules coniques sur les interstries un peu relevés et sur une ligne longitudinale sur le côté; un bourrelet longitudinal garni de granules luisants limite, à la base, en dedans, l'épipleure.

Le type seul de cette nouvelle espèce est connu.

Adresse de l'auteur :

Académie de Bordeaux
29, Cours d'Albret
F-33 Bordeaux